MAGNUM GEL BLATTES 40g

PROPRIETES :

- **Action retardée**
- **Très appétent**
- **Contre toutes espèces de blattes**



INSECTICIDE APPÄT SOUS FORME DE GEL
AMM BIOCIDES: FR-2017-0090
TP18 Usage Professionnel

Concentration des matières actives :
-Imidaclopride (Cas n° 138261-41-3) : 2,15 %
-Bitrex : 0,008 %

Réf. INSCT1037 – cartouche de 40 g
A l'unité : fournie sans poussoir ni pipette

Contexte d'utilisation

MAGNUM GEL CAFARDS est le résultat du développement d'une nouvelle technologie de formulation qui proportionne à l'appât une Delaying action© ou Action retardée©, qui empêche l'insecte d'identifier l'origine de son intoxication. Le résultat final est un contrôle plus complet et effectif sans nécessité de prolonger le temps de traitement. La formule de MAGNUM GEL CAFARDS a été dessinée pour attirer les adultes et les nymphes de *Blatella germanica, Blatta orientalis et Periplaneta americana*.

DELAYING ACTION© OU ACTION RETARDEE©

MAGNUM GEL CAFARDS est une formulation qui retarde l'action de l'Imidaclopride, approximativement 3 fois, par rapport aux formulations classiques pour gels. Nos recherches ont permis d'obtenir un délai d'élimination des cafards, d'environ 1 heure. Ce qui permet d'exploiter au maximum les avantages de l'action retardée, sans pour autant augmenter le temps nécessaire pour contrôler l'infestation.

L'Imidaclopride qui compose le magnum gel permet une modification de la transmission des stimuli nerveux de l'insecte et entraine une paralysie nerveuse des blattes puis leur mort.



Peut être utilisé dans les mini stations pour gel (Réf. CHEBI1107) vendues par 25 Permet d'appliquer le gel blattes en le préservant de la poussière et des interactions avec les animaux et occupants

Mode d'emploi

- Appliquer le gel dans les endroits les plus fréquentes par les cafards, comme les fentes les rainures des cuisines, et les endroits ou des aliments ont été manipulés, sous et derrière les électroménagers comme les lave-vaisselles, réfrigérateurs, congélateurs, fours, etc.

- Appliquer en forme de petites gouttes d'approximativement 0,04 g, étant donné que l'application en forme de bandes n'offre aucune augmentation d'efficacité.

1 goutte de 0,04 g = 1 goutte de 4 mm de diamètre

Pour B. germanica ***3 à 4 gouttes au m²***

Pour B. orientalis et P. americana ***4 à 6 gouttes au m²***

- Les gouttes d'appât resteront actives et appétences pendant plusieurs mois.

- On conseille de faire une inspection 1 semaine après l'application, dépendant le degré d'infestation et si nécessaire remplacer le gel consomme.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.



ATTENTION

Mentions de danger : H410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence : P102 Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P391 Recueillir le produit répandu.P501 Éliminer les résidus du produit et de son récipient avec toutes les précautions possibles.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.