PATE Brodifacoum 29 ppm



PROPRIETES :

- *Traitement choc*
- *Efficace sur tous les Rongeurs*
- *Bonne appétence*

POINTS FORTS :

- Technologie FLUO NP
- Enrichi en céréales

Réf.RDTB1150 Pâte Brodifacoum 29ppm (seau de 5kg)
Réf.RDTB1151 Pâte Brodifacoum 29ppm (carton de 10kg)

Appât rodenticide (TP14) prêt à l'emploi sous forme de pâte contre les souris domestiques, les rats bruns et les rats noirs.

Composition : *Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0) - 0.0029% -* ***N° AMM : FR-2017-0106***

Contexte d'utilisation

BRODITEC P-29F est un appât rodenticide prêt à l'emploi, sous forme de pâte conditionné en sachets individuels de 15 g, bien adapté à l'élimination de souris domestiques et rats – rat brun et rat noir. Le produit est utilisé sur les organismes cibles du stade juvénile au stade adulte. BRODITEC P-29F est à base de brodifacoum, substance active anticoagulante de deuxième génération à prise unique. Le mode d'action de la substance active permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs de la colonie, qui continuent à consommer le produit. BRODITEC P-29F présente les caractéristiques innovantes et brevetées suivantes : **- Technologie FLUO-NP®** : grâce à la technologie d'un colorant fluorescent, l'appât peut être facilement identifié même dans de mauvaises conditions d'éclairage, s'il est illuminé avec une lampe UV. Lorsque l'appât est mangé par les rongeurs, la formulation fluorescente rend les fèces des rongeurs clairement visibles sous la lumière UV, ce qui donne la possibilité de surveiller l'activité des rongeurs. La surveillance, soit de la consommation des appâts, soit de leur éventuel déplacement des points d'appâtage, sont des aspects importants, dans les industries alimentaires, les entrepôts et les sites zootechniques, où il est important que les appâts restent dans les postes d'appâtage. La technologie FLUO-NP® facilite également la détection de tout résidu laissé et facilite leur collecte pour une élimination appropriée. **- PASTA PLUS** (Brevet européen n° 1 279 334 B1) : une formulation brevetée combinant un mélange bien équilibré de composants d'origine alimentaire, tels que farine lactée, sucre et graisses enrichies en céréales, particulièrement appétent pour les espèces cibles mentionnées cidessus. Grâce à sa forte appétence, l'appât est extrêmement polyvalent; son usage est indiqué dans des zones présentant une forte concurrence alimentaire, comme dans les industries alimentaires et les entrepôts de stockage, hôtels, restaurants, bars, etc. Le produit peut également être utilisé à l'intérieur des installations de distribution d'énergie et dans les moyens de transport . BRODITEC P-29F contient un agent amérisant (Benzoate de dénatonium) pour aider à prévenir la consommation par l'homme. BRODITEC P-29Fest destiné à une utilisation par les professionnels et à être utilisé contre les souris domestiques et les rats bruns et noirs, à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments.
Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés ou dans des points d'appâts couverts et protégés.

Mode d'emploi

Catégorie d'utilisateur : Professionnels
Méthode d'application : Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés ou dans des points d'appâts couverts et protégés.
Dose et fréquence d'application : *Pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur autour des bâtiments*
Contre les souris domestique (Mus musculus)
• Faible infestation : jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres
• Forte infestation : jusqu'à 50 grammes de produit par point d'appât espacés de 2 mètres.
Contre les rats (Rattus norvegicus et Rattus rattus)
• Faible infestation : jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 10 mètres
• Forte infestation : jusqu'à 100 grammes de produit par point d'appât espacés de 5 mètres.
Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
Instructions d'utilisation : Les appâts doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite. Prendre les mesures adéquates et en réponse à l'AMM au-delà des 35 premiers jours.
Pour l'utilisation à l'extérieur autour des bâtiments :
Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement.

Mentions de danger : H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Conseils de prudence : P314: consulter un médecin en cas de malaise. P501: Eliminer le contenu/récipient selon la règlementation en vigueur.



DANGER